


AANBEVELING OVER ONDANSETRON ALS AANVULLING OP ORS BIJ KINDEREN MET GASTRO-ENTERITIS


BEHANDELOPTIES



POPULATIE



AANBEVELING



WAAROM DEZE AANBEVELING?

We geven een zwakke aanbeveling omdat voor het merendeel van de patiënten de mogelijke voordelen (voorkomen van een ziekenhuisopname, stoppen met braken) opwegen tegen de kleine kans op milde bijwerkingen.

VERWACHTE GEWENSTE EN ONGEWENSTE EFFECTEN

	In het voordeel van ondansetron + ORS	Geen verschil	In het voordeel van ORS	Kwaliteit van bewijs (GRADE)
Ziekenhuisopname/binnen 8 uur	64 per 1000 69 minder per 1000		133 per 1000	★ ★ ☆ ☆ Laag
Stoppen met braken binnen 8 uur	810 per 1000 246 meer per 1000		564 per 1000	★ ★ ☆ ☆ Laag
Bijwerkingen	Een eenmalige dosis ondansetron werd in de meeste onderzoeken goed verdragen en de bijwerkingen waren vergelijkbaar in beide groepen.			★ ★ ★ ☆ Redelijk



BIJWERKINGEN

Bekende bijwerkingen zijn hoofdpijn, opvliegers, obstipatie, buikpijn, diarree en overgevoeligheid.

Als ernstige bijwerking zijn hartritmestoornissen gemeld, vooral bij patiënten met een verlengd QT-interval [door hartaandoeningen, bradycardie of medicatie].



WAARDEN EN VOORKEUREN

We verwachten dat het merendeel van de [ouders van] patiënten de mogelijke voordelen [lagere kans op ziekenhuisopname, grotere kans op stoppen met braken] vindt opwegen tegen de kans op mogelijke bijwerkingen. Voor een [kleine] groep kinderen met een [risico op een] verlengd QT-interval zullen de voordelen niet opwegen tegen het risico op hartritmestoornissen.