

episodes of this type of disease which makes the major part of their disease „cluster”. The potentialities of this hypothesis are discussed in detail.

*Cust, G. and C. Hodes. A survey of knowledge of diabetes mellitus in the patients of a general practice (1967) J. Coll. gen. Practit. 13, 313-320.*

A survey was carried out on the knowledge of diabetes of 255 patients of a general practice. This revealed a state of ignorance particularly with regard to symptoms. Eighty per cent of all patients thought diabetes could be treated successfully. Sources of information were, in descending order of importance: diabetics, newspapers, books, magazines, radio and television.

*Baldwin, J. T. The use of a nurse in general practice. (1967) J. Coll. gen. Practit. 13, 364-367.*

The almost universal observation is that the doctors and nurses all like it, and in every case the standards of practice are improved. Adverse comments are rare and apply probably to practices where the nurse is employed more as a receptionist than a professional ancillary helper. Provided a nurse is employed in a professional capacity, the standard of practice of the doctors who employ her is immediately and permanently raised to a new level.

*Graham, P. J. e.a. Childhood asthma: a psychosomatic disorder? Some epidemiological considerations. (1967) Brit. J. prev. soc. Med. 21, 78-85.*

In an epidemiological study of the inter-relations of physical, psychiatric and educational handicaps, the one-year prevalence rate for asthma in the population of 9, 10 and 11 year-old children living on the Isle of Wight was found to be 2.0 per cent. (2.3 per cent if probable as well as definite cases are included). The general intelligence of the asthmatics was somewhat higher and their educational attainments somewhat lower than in the general population. Neither of these differences was significant. Concomitant psychiatric disorder was slightly more common in the asthmatic group (10.5 per cent), than in the general population (6.3 per cent) but children suffering from a miscellaneous group of other physical disorders showed a rate similar to that of asthmatic children. On the other hand emotional stress frequently precipitated the onset of the individual asthmatic attack.

*Miller, G. E. Continuing education for what? (1967) J. med. Educ. 42, 320-326.*

Continuing education should mean continuing self-education not continuing instruction. If this desirable goal is to be accomplished, there must be movement away from the content model, which encourages dependence upon teachers to a process model, which demands a significant measure of selfreliance, a shift away from preoccupation with courses and methods, towards an augmented concern for educational diagnosis and individualized therapy. It does not mean an immediate abandonment of present program forms, but it is likely to be accompanied by a slow erosion of the faith which presently support them.

#### RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS


Bijdragen worden bij voorkeur tegemoet gezien in machineschrift, in duplo, met toepassing van een brede kantlijn en op ten minste anderhalve regel afstand getypt. Men besluite het artikel met een korte samenvatting.

## Tips voor de huisarts

*Tip 4. Bloedbezinking apparaat met wegwerppipetten.*

Door de Amsterdamsche Chinine Fabriek is leverbaar een plastic, dus afwasbaar, apparaat voor de bepaling van de bezinkingssnelheid van de rode bloedlichaampjes, met wegwerppipetten van polypropyleen en wegwerpmengsputten. De plastic standaard, waarin ruimte is voor tien wegwerppipetten, kan gemakkelijk aan de muur worden bevestigd.

De prijs van de standaard, welke van een schaalverdeling voorzien is, bedraagt f 7,—; beduidend lager dan die van de tot nu toe gebruikelijke apparaten. De pipetten kosten f 7,25 per honderd stuks. In de bijbehorende wegwerpsputten, die uitstekend van constructie zijn, kan het citraat met het bloed zeer gemakkelijk worden gemengd. Deze spuitten kosten echter f 35,50 per 100 stuks, waardoor de prijs van een bepaling tamelijk hoog wordt. Men kan echter in plaats van deze speciale mengsputten een recordspuit gebruiken. Dit apparaat, dat met de documentatie op de afdeling voorlichting van het N.H.I. aanwezig is, blijkt in de praktijk goed te voldoen.



*Tip 5. Comfortair Matras. Voor patiënten, die langdurig bedlegerig zijn en/of neigen tot decubitus, is de „Comfortair Matras” onzes inziens zeer geschikt. De „Comfortair Matras” is een witte vacht van polyester vezel, welke in de wasmachine kan worden gereinigd en gecentrifugeerd. De matras is eveneens bruikbaar voor het baby-spreekuur als onderlaag op de uitkleedtafel. De prijs bedraagt f 28,— per vacht. Bij afname van een aantal geldt de kwantum-korting. Documentatie is aanwezig op de afdeling Voorlichting.*

Afdeling Voorlichting  
Nederlands Huisartsen-Instituut