A	B	Bo	C	D	E	F	G	H	I-J	K	L	M	N	O	PQ	R	S	Se	T	U	V	W	XY	Z					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

naam M H. vrn. geb. 6 - 8 - 1912 fin. nr.

adres T.S. ELIOT PLANTSOEN 27 telef. beroep BANKETBAKKER gd.

uitgangssituatie d.d. VANAF IN DE PRAKTIJK KOMEN

klachten primair: BEKEND MET DIABETES

dorst ☐ vermagering ☐ moeheid ☐

polyurie ☐ pruritus vulvae ☐

klachten secundair:

nacht. krampen in benen ☐ paraesth. ☐

mononeur. uitvalversch. ☐ erektiest. ☐

recidiv. urineweginf. ☐ visusst. ☐

infektie/koude voeten ☐ claudicatio ☐

anamnese: obstetrisch/familie

vr. ziekten: 1973 CATARACT EXTR. O.S

1969 NIERSTEEN RE.

medic.: pil ☐ diuretica ☐ corticost. ☐

psycho-soc.-problematiek WORDT BANKETBAKKER

GESPREKSGENOOT

advies van diëtist(e): 1600 CAL.

86 g. EIW. T. 62 g. vet

170 g. KOOLHYDRAAT

diagnose(s):

lich. onderzoek

ALGEMEEN

gew. 74 L. 1.72

tensie 150/85

hepar/lien

voethygiëne

a. dors. ped. + +

OOGONDERZOEK

fundus 2-j. CONTROLE OOGARTS

visus

lens GEEN RETINOPATHIE

evt. NEUROPATHIE

sens. st. —

vibratiezin OK

KPR Symm

APR

VZR

DIABETESKAART N.H.I.
uitgegeven door het
Nederlands Huisartsen Instituut

laboratorium en aanvullend onderzoek

URINE: 24 uurs BLOED:

red. — 2 u. na koolh. rijke maaltijd

aceton — bloedsuiker 160 mg %

eiwit — kreat.

sediment geb

kweek (dipslide)

evt. X-thorax geb evt. E.C.G. MOGELIJK OUD VOORWAND INFARCT

spec. onderzoek:

SUIKER BLOED mmol/l	SUIKER URINE in gr.	GEW. IN KG
		110
		108
	100	106
34		104
		102
32	90	100
		98
30		96
	80	94
28		92
		90
26	70	88
		86
24		84
	60	82
22		80
		78
20	50	76
		74
18		72
	40	70
16		68
		66
14	30	64
		62
12		60
	20	58
10		56
		54
8	10	52
		50
6		48
	0	46
4		44
		42
		40

DATUM	BLOEDSUIKER in m. mol/l	URINESUIKER IN GRAMMEN 24 u. hoev.	24 u. gr.	8–12 u. hoev.	8–12 u. gr.	12–18 u. hoev.	12–18 u. gr.	18–22 u. hoev.	18–22 u. gr.	22– 8 u. hoev.	22– 8 u. gr.	ACETON	STREEFGEW. KG GEW.	AANV. LAB. ONDERZOEK ei-wit	dipsl.	kreat.		ALG. LICH. ONDERZOEK m.n. tensie, voeten, fundus (oogarts)	X-thorax ECG	alg. welbevinden/klachten (dieet, hypo's)	therapie (dieet, advies)	revisie
	← per één tot twee jaar →																					
	← per drie maanden →																					
8/8-78	154 mg%	~~Afw~~	Afw									–	73					140/80 1		Voelt zich prima	Dieet, 2x Rastinon 500 mg	3 mnd
1/12-78	DAGCURVE		260 mg%		300 mg%		350 mg%					–	76	–				NAAR oogarts		Voelt zich beter dan ooit	Retour dietiste, Rastinon	2 mnd
28/4-78	DAGCURVE		276 mg%		292 mg%		312 mg%					–	78					Vibratiezin Ok, Oogartsgb.		Geen klachten	Rastinon 3x500 mg	2 mnd
25/5-79	270/310/350		+									SPOOR									NAAR INTERNIST	
2/7-79			–									–				Norm		Lipiden norm	X	Voelt zich prima.	DAONIL 2/1	3 mnd