

(bijvoorbeeld een verkeerde diagnose). In het vervolgconsult om te bepalen waar het aan ligt als een patiënt nog steeds klachten heeft en eventueel om een patiënt te complimenteren met zijn/haar therapietrouw ter bevordering van therapietrouw in de toekomst.

Dankbetuiging

Wij willen graag alle projectgroepleden van het DIAMOND-onderzoek hartelijk danken voor hun bijdrage aan dit onderzoek, alsmede alle huisartsen die geparticipeerd hebben. Daarnaast willen wij graag Marianne van der Velde (bachelor stagiaire gezondheidswetenschappen) hartelijk danken voor haar medewerking bij de gegevensinvoer en statistische analyses.

Het DIAMOND-onderzoek is gefinancierd door ZonMW.

Literatuur

- 1 Van Bommel MJ, Numans ME, De Wit NJ, Stalman WA. Consultations and referrals for dyspepsia in general practice - a one year database survey. *Postgrad Med J* 2001;77:514-8.
- 2 College Voor Zorgverzekeringen. GIP signaal Gebruik van Maagmiddelen 1996-2001. Amstelveen: College Voor Zorgverzekeringen; 2002.
- 3 Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO, Nederlands Huisartsen Genootschap NHG. Multidisciplinaire Richtlijn Maagklachten. Alphen aan den Rijn: Van Zuiden Communications; 2004.
- 4 Numans ME, De Wit NJ, Dirven JAM, Hurenkamp GJB, Meijer QCM,


- Muris JWM, et al. NHG-Standaard Maagklachten. www.nhg.org.
- 5 Fransen GAJ, Van Marrewijk CJ, Mujakovic S, Muris JW, Laheij RIF, Numans ME, et al. Pragmatic trials in primary care. Methodological challenges and solutions demonstrated by the DIAMOND-study. *BMC Medical Research Methodology* 2007;7-16.
 - 6 Krol N, Muris JW, Schattenberg G, Grol R, Wensing M. Use of prescribed and non-prescribed medication for dyspepsia. *Scand J Prim Health Care* 2004;22:163-7.
 - 7 Harris SB, Petrella RJ, Lambert-Lanning A, Leadbetter W, Cranston L. Lifestyle management for type 2 diabetes. Are family physicians ready and willing? *Can Fam Physician* 2004;50:1235-43.
 - 8 Frijling BD, Lobo CM, Hulscher ME, Van Drenth BB, Braspenning JC, Prins A, et al. Provision of information and advice in cardiovascular care: clinical performance of general practitioners. *Patient Educ Couns* 2002;48:131-7.
 - 9 Silagy C, Muir J, Coulter A, Thorogood M, Yudkin P, Roe L. Lifestyle advice in general practice: rates recalled by patients. *BMJ* 1992;305:871-4.
 - 10 Akici A, Kalaca S, Ugurlu MU, Toklu HZ, Iskender E, Oktay S. Patient knowledge about drugs prescribed at primary healthcare facilities. *Pharmacoepidemiol Drug Saf* 2004;13:871-6.
 - 11 Duaso MJ, Cheung P. Health promotion and lifestyle advice in a general practice: what do patients think? *J Adv Nurs* 2002;39:472-9.
 - 12 Mesters I, Creer TL, Gerards F. Self-management and respiratory disorders, guiding patients from health counseling and self-management perspectives. In: Kaptein A, Creer TL, editors. *Respiratory disorders and behavioral research*. Harwood Academic Publishers; 2006.

Abuis

Hein Hogerzeil eerste voorzitter NHG

Emeritus hoogleraar Huisartsgeneeskunde Heert Dokter wees ons op een storende fout. In de recensie van Betty Meyboom-de Jong over 'Family Medicine' van Frans Huygen (Huisarts Wet 2007;50(7):337) staat terecht dat Frans één van de oprichters van het NHG was. Echter, hij was niet de eerste voorzitter, dat was Hein Hogerzeil, die later hoogleraar Sociale Geneeskunde in Groningen is geweest.

Uit de eerste jaargang



Huisarts Wet 1958;1:91.